

Kỹ thuật

TRỒNG TRÁM TRẮNG

Cần chặt nuôi dưỡng vào tuổi thứ 6: Chặt cây xấu, chặt 1 chừa 1. Trồng đầy cần tỉa 2 lần cách nhau 3 - 4 năm. Sau khi chặt thưa cần bón phân theo cách: Đào 3 hố đều quanh gốc, mỗi gốc bón 5 - 7kg phân chuồng + 2kg NPK. Cứ 3 năm bón 1 lần cây mới đủ dinh dưỡng để cho nhiều quả, nhựa và gỗ.



7. Thu hoạch

Trích nhựa: Mổ máng theo đường trích sát gốc và đặt chậu hứng nhựa. Cần trích vừa phải, tránh khai thác triệt để. Nhựa trám tốt có màu tự nhiên và tạp chất dưới 25%.

Thu quả: Trám chín hoàn toàn vào tháng 11 - 12. Có thể thu hái bằng cách treo hái hoặc nhặt quả chín quanh gốc.

Thu sớm vào các tháng 8 - 9 để lấy quả làm mứt.

Thu giữa mùa (thu quả già): Thu vào tháng 9 - 10 lấy quả ăn tươi.

Thu muộn: Mùa thu hoạch chính vào tháng 11 - 12 (quả đạt khối lượng và dưỡng chất cao nhất) dùng để chế biến keo, rượu, tương và các loại nước giải khát.

Thu gỗ: Sau khi kinh doanh quả, nhựa có thể thu hoạch gỗ để bán hoặc sử dụng.



I. GIÁ TRỊ SỬ DỤNG VÀ ĐẶC ĐIỂM GIỐNG

1. Giá trị sử dụng

Gỗ tốt, mềm, nhẹ có thể dùng làm ván dăm, bột giấy.

Nhựa trám dùng để chế: Keo, sơn, vecni, xi, xà phòng, dầu thơm, dược liệu. Nhựa trám có 50 - 70% Colophan , tinh dầu dùng thay nhựa thông chế tùng hương trong công nghệ.

Quả trám dùng làm thức ăn, chế biến thành Ô mai, mứt; Chế biến thành các vị thuốc giải độc, chữa tê thấp, ỉa chảy, viêm họng...

2. Đặc điểm giống

Là cây thân gỗ lớn thường xanh cao 25 - 30m, thân thẳng, vỏ trắng nhẵn, nhựa thơm.

Lá kép lông chim 1 lần lẻ, màu xanh đậm, mọc tập trung ở đầu cành.

Hoa tự chùm đầu cành, nách lá, mẫu trắng vàng đơn tính, ra vào tháng 3 - 4.

Quả hạch, dễ tách; hạt hình thoi màu nâu, nhân hạt màu trắng. Quả chín tháng 3 - 4.

3. Điều kiện sống

Phân bố đều trong cả nước và ở các vùng có độ cao từ 100 - 600 m, lượng mưa 1600 - 2000 mm/năm.

Trong rừng chiếm tầng trên, là loài tiên phong nên thường gặp ở rừng phục hồi.

Là loại cây ưa sáng, mọc rất nhanh.

Thích nghi đất tầng dầy, ẩm, thoát nước.

II. CHỌN GIỐNG, TẠO CÂY CON

1 - Chọn giống

Chọn giống Trám trắng (vì có nhiều giống trám khác nhau).

Chọn cây , chọn quả: Chọn các quả to, mập từ các cây trên 10 năm tuổi, tán rộng, thân khoẻ, không bị sâu bệnh.

Quả thu về ngâm nước đun sôi 3 giờ, sau đó vớt ra dùng dao cắt dọc quả và tách hạt. Đem hạt phơi khô (không được đem gieo ngay) trong bóng râm; sau đó bảo quản trong các chum vại... và để ở nơi khô, thoáng mát.

2. Tạo cây con

Đem hạt ngâm nước 2 giờ, sau đó vớt ra, ủ nứt nanh và đem gieo vào bầu. Bầu có kích thước 8 x 18 cm; ruột bầu là đất mẫu + 10 - 15% phân chuồng hoai mục.

Sau khi gieo làm giàn che 50% ánh sáng và thường xuyên tưới ẩm. Sau 3 tháng bỏ dàn che. Sau 6 - 7 tháng, cây giống đạt kích thước 50 - 70 cm có thể đem trồng.

III. KỸ THUẬT TRỒNG

1. Thời vụ

Tốt nhất trồng vào vụ xuân. Có thể trồng vào vụ thu khi thời tiết mát mẻ, hoặc có mưa.

2. Làm đất, đào hố:

Làm đất, đào hố 1 tháng trước khi trồng.

Đào hố: Nơi đất bằng đào hố có kích thước rộng 60 - 80 cm, sâu 50 - 60 cm; Nơi đất dốc rộng 80 - 100 cm, sâu 60 - 80 cm.

3. Mật độ trồng

Nơi đất bằng tốt trồng 400 cây/ha (khoảng cách trồng 5 x 5 m); Đất dốc xấu trồng 500 cây/ha (khoảng cách trồng 4 x 5 m).

4. Bón lót

6 - 7kg phân hữu cơ + 0,25kg phân lân (P_2O_5).

5. Cách trồng:

Trồng bằng cây bầu: Bón phân, lấp hố trước 1 tháng. Nên trồng vào lúc trời râm mát hoặc có mưa. Đắp gốc cao so với mặt đất 5 - 10 cm. Chú ý: Bóc vỏ bầu trước khi trồng; Khi trồng song dân chặt quanh gốc và tạo gờ thoát nước.

Có thể gieo thẳng tuy tỷ lệ nảy mầm thấp nhưng đỡ tốn kém. Chú ý tổ chức kiểm tra và trồng dặm đối với các hố có hạt không nảy mầm.

6. Chăm sóc, bảo vệ

Chăm sóc trong 3 năm.

Năm đầu: 2 lần. Lần 1 sau trồng 3 tháng: xới, vun gốc rộng 50 - 60 cm; lần 2 vào cuối năm: Vun gốc, phát thực bì dọc hàng cây rộng 1 m.

Năm thứ 2: Chăm sóc như năm đầu nhưng phát rộng 2 m.

Năm thứ 3: 1 lần như lần 2 năm thứ 2.

Rừng non cần chống gia súc, người phá hoại. Cần phòng trừ sâu cuốn lá phá hoại.