



# CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM

282 Lê Văn Sỹ - Q. Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh. ĐT : 08.8444633 - 9906343 \* Fax : 08.8442387  
CHI NHÁNH : 585 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Gia Lâm - Hà Nội - ĐT: 04.8774958 \* Fax : 04.8274343



## HÃY TRỒNG BẮP NẾP LAI (F1)

# MX2 & MX4

(CHỈ CÓ 60-65 NGÀY LÀ THU TRÁI TƯƠI)

☞ SINH TRƯỞNG MẠNH - THÍCH NGHI RỘNG

☞ NĂNG SUẤT CAO (11-13 TẤN TRÁI TƯƠI/HA)

☞ CHẤT LƯỢNG HẠT GIỐNG TỐT

☞ HƯƠNG VỊ THƠM NGON - DẸO.



TRÁI LOẠI 1 > 95%



CÔNG TY CỔ PHẦN  
GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM

TRẠM KHUYẾN NÔNG  
HUYỆN VĨNH CỬU

ĐIỂM TRÌNH DIỄN  
GIỐNG BẮP NẾP LAI

# MX-2

ĐÔNG XUÂN 01-02



# KỸ THUẬT TRỒNG BẮP NẾP LAI (F1)

## MX2 & MX4

**ĐẶC TÍNH:** Sinh trưởng mạnh, chống chịu bệnh đốm vằn tốt, ít đổ ngã, thích nghi rộng. Tiềm năng năng suất trái tươi còn vỏ đạt 17-18 tấn/ha, năng suất trung bình 11-13 tấn/ha, tương ứng 7-8 tấn/ha trái tươi lột vỏ. Tỷ lệ trái loại 1 cao hơn 95 %. Luộc ăn tươi, bắp có hương vị thơm, ngọt và dẻo.

**THỜI VỤ:** Có thể trồng được nhiều vụ trong năm trên chân ruộng chủ động tưới tiêu. Tuy nhiên cần tránh gieo vào các tháng mà giai đoạn bắp trở cờ phun râu gặp thời tiết nắng quá khô nóng, trái khó đậu hạt. Trồng bắp nếp cần cách ly (về không gian hoặc thời gian) với ruộng bắp ngọt hay bắp vàng để đảm bảo chất lượng trái bắp nếp thơm dẻo, màu sắc trắng đẹp.

**MẬT ĐỘ - KHOẢNG CÁCH - LƯỢNG GIỐNG:** Sử dụng 12-15 kg hạt giống/ha. Khoảng cách trung bình 70 x 25 cm, gieo 1 hạt/hốc, gieo thêm 10 % số bầu để trồng dặm, đảm bảo mật độ khoảng 57000 cây/ha. Rải thuốc hạt Furadan hay Basudin ngay sau gieo để ngừa kiến, để hại cây mầm.

**BÓN PHÂN:** Lượng phân khuyến cáo bón cho 1 ha : 5-10 tấn phân chuồng hoai, 250 kg Urê, 400-450 kg Super Lân, 90-100 kg Kali (KCl). Chia ra bón như sau:

Loại phân	Đơn vị	Tổng số	Bón lót	Bón thúc		
				10NSG	20NSG	35NSG
P. Chuồng	Tấn	5-10	5-10			
Super Lân	kg	400-450	400-450			
Urê	kg	250		50	100	100
KCl	kg	90-100		30	30	30 - 40

Ghi chú: Bón phân thúc vào các ngày 10, 20, 35 sau khi gieo. Giai đoạn này, nên phun thêm phân bón lá SUPERMES để cây phát triển tốt, cho năng suất cao. Sau thụ phấn, có thể bón nuôi hạt 10 kg Urê + 5 kg Kali.

**CHĂM SÓC-PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH:** Giai đoạn cây con và 2 tuần trước trở cờ đến 2 tuần sau trở cờ, cần tưới đủ ẩm, tránh úng để cây phát triển mạnh, cho trái và hạt phát triển tốt.

Chủ động diệt cỏ bằng thuốc đặc trị MAIZINE 80 WP, phun giai đoạn trước nảy mầm. Các thời kỳ bón phân thúc, kết hợp xới xáo, làm cỏ và vun gốc cho cây. Nên loại bỏ các trái ra sau để tập trung dinh dưỡng cho trái chính. Trên ruộng giàu dinh dưỡng hoặc bón nhiều phân đạm giai đoạn cây con, bắp có hiện tượng đẻ nhánh từ thân chính, nên loại bỏ sớm các nhánh này.


\* Để phòng sâu đục thân, đục trái non: rải Basudin, Furadan hay Regent hạt vào loa kèn khi bắp được 7-8 lá và trước khi bắp trở cờ. Phun ngay Selecron, Pynrex... vào giai đoạn sâu non mới nở.

\* Để hạn chế bệnh đốm vằn, giai đoạn trước trở cờ, nên loại bỏ các lá già có vết bệnh ở sát gốc. Nếu mưa ẩm nhiều, phun Validacin, Anvil hay Bonanza để ngừa bệnh.

\* Để ngừa bệnh đốm lá, phun Tilt hay Appencab.

**THU HOẠCH:** Nếu dùng bắp ăn tươi, thu trái sau khi phun râu 18 ngày (hoặc sau khi gieo 60-65 ngày). Nếu cần bắp khô, thu hoạch từ 75 đến 80 ngày sau khi gieo. Thời tiết lạnh, thời gian thu sẽ muộn hơn.

**CHÚ Ý :** Hạt giống đã xử lý thuốc, không làm thức ăn cho người hay gia súc  
Vì là giống lai, không sử dụng hạt của trái thương phẩm làm giống cho vụ sau.



**NHÂN HIỆU MẦM XANH - HẠT GIỐNG TỐT NHẤT - TỐT GIỐNG BỘI THU**