



SỬ DỤNG PHÂN BÓN LÁ CHO CÂY TRỒNG Ở TÂY NGUYÊN

1. Cây Đậu xanh:

- Khi Đậu xanh vừa nhú hoa : Pha 35 ml Đậu trái C.A.T (khoảng 2 nắp lưng) / 8 lít phun sương cho Đậu xanh nhằm giúp cây đậu nhiều trái, trái nhiều hạt. Có thể pha chung với thuốc trừ sâu rầy để tiện công phun.
- Khi trái đã hình thành: Phun **Dưỡng trái** (35 ml / 8 lít) + thuốc trừ sâu rầy giúp trái to, hạt chắc. Phun sương 2 lần, cách nhau 5-7 ngày.

2. Cây Cà phê:

- Vào đầu tháng 12 AL, khi bắt đầu tưới nước cho Cà phê ra hoa, trong vòng 1-2 ngày sau pha 15g **F.Bo** / 8 lít phun sương đều cả cây giúp Cà phê ra hoa đồng loạt, đậu trái nhiều và chống chịu nắng hạn tốt.
- Khoảng tháng 4 AL, khi vào vụ mưa, trái thường rụng nhiều, cần phun ngay **Đậu trái C.A.T** (35 ml / 8 lít) cho Cà phê để hạn chế hiện tượng rụng này.
=> có thể pha thêm thuốc trừ sâu bệnh cho tiện công phun xịt.

3. Cây Hồ tiêu:

- Khi bắt đầu mùa mưa: phun 1 lần cho vườn tiêu chế phẩm **Nutrimix** (15 ml / 8 lít) => giúp tiêu sung sức, chuẩn bị ra đợt và hoa mới.
- Khi tiêu bắt đầu nhú đợt non, hoa và sắp ra đợt hoa rộ: phun sương **F.Bo** (15 g / 8 lít) 1 lần => giúp tiêu ra hoa sớm, đồng loạt.
- Khi gié tiêu dài 3-4 cm (lứa hoa chính): pha 35 ml **Đậu trái C.A.T** (2 nắp lưng) trong 8 lít nước phun sương đều đợt lá, gié hoa non và cả cây => giúp hoa tiêu vươn ra mạnh, tăng sức chống chịu cho hoa, giúp tăng tỷ lệ kết hạt tiêu, chống hiện tượng "**tiêu bồ cào**" tức gié trái thưa do tỷ lệ đậu thấp, hạt kém phát triển.
- Khi chuỗi hạt tiêu đã hình thành rõ, hạt tiêu đang lớn: pha 15 ml **Nutrimix** + 15 gr **F.Bo** / 8 lít phun sương trên lá => giúp hạt chắc, nặng (đạt trên 500 g / 1 lít), đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

4. Cây Điều:

- Khi điều rụng gần hết lá và đang nhú đợt mới phun **F.Bo** (15 g / 8 lít) cho điều 1 lần để giúp điều ra hoa đồng loạt, dễ đậu trái sau này.
- Điều ra hoa nhiều nhưng tỷ lệ đậu trái rất thấp. Để tăng đậu trái cần phun thuốc 3 lần:
 - **Lần 1** - khi 80% phát hoa vừa nhú 10 cm: pha 35 ml **Đậu trái C.A.T Điều** (2 nắp lưng) + 10 ml **Cymerin** / 8 lít phun sương đều cây.
 - **Lần 2** - khi 80% phát hoa dài hết cở, bắt đầu có hoa nở: pha 35 ml **Đậu trái C.A.T Điều** + 10 ml **Helocarb 500 HF** (hoặc **Carbenzim**) / 8 lít phun sương đều cây. **Đặc biệt:** nếu gặp mưa hay sương bất chợt thì phun thuốc như trên rất hiệu quả nhất là gặp mưa kéo dài.
 - **Lần 3** - khi 80% hạt to bằng hạt sen: pha 40 ml **Đậu trái C.A.T-Điều** + 10 ml **Cymerin** / 8 lít phun sương đều cây.

5. Cây lúa:

Pha 15 g F.Bo / 8 lít, phun sương đều bụi lúa vào các thời điểm:

- **35-40 ngày sau sạ:** chống đổ lổp, giải độc phèn (phèn làm đổ lá lúa), chống nghẹt rễ và đốn đồng, thúc lúa tạo đồng (bông) mập, tốt.
- **55-60 ngày sau sạ (khi có tim đèn):** giúp lúa trở đều, chống hiện tượng nghẹn đồng, giảm tối đa số hạt lép. Có thể pha chung với thuốc phòng trừ bệnh đốm vằn, đạo ôn, cổ bông.
- **Khi lúa mới ngâm sữa:** giúp hạt chắc, mẩy, bông, màu vàng sáng và chín đồng loạt. Sản lượng và chất lượng cao.

6. Sầu riêng:

a. Xử lý ra hoa: *Khi lá chuyển già, các lá mới đã thành thực:*

- Xiết nước (tạo khô hạn): ngưng tưới và quét dọn gốc cho đất mau khô.
 - Thời gian xiết nước khoảng 7-14 ngày rồi tưới ẩm lại (kết hợp tưới calê).
 - Sau khi tưới nước lại 2-3 ngày, pha 15 gr F.Bo + 35 ml **Ra hoa C.A.T** (2 nắp lưng) / 8 lít phun sương 2 lần (7 ngày / 1 lần).
- thuận lợi thì sau 20-40 ngày nụ hoa bắt đầu xuất hiện.

b. Tăng đậu trái: *Khi nụ hoa xuất hiện:*

- Pha 35 ml **Đậu trái C.A.T** (2 nắp lưng) / 8 lít phun sương lên cả cây giúp hoa khỏe, chuẩn bị dinh dưỡng cho trái non.
- Nên tiến hành tỉa bớt hoa khi đường kính nụ hoa cỡ 0,7-1 cm vì SR thường ra quá nhiều hoa, cây sẽ mất sức mà số quả trên cây chỉ nên để giới hạn. Cần tỉa bỏ các chùm hoa mọc sát thân hoặc ở đầu cành, các chùm hoa mọc quá xít nhau.
- **Khi hoa đã nở:** người ta thường lấy phấn của giống này chấm cho giống khác và ngược lại. Có cách làm hiệu quả: vào lúc SR nở rộ, từ 6 h đến 9 h tối thấp vài ngọn đèn neon trong vườn để hấp dẫn côn trùng đến thụ phấn cho SR, thấp liên tục 3-5 ngày => hoa đậu rất nhiều để dễ chọn.

c. Nuôi trái:

Khi lứa quả đầu có đường kính 3-5 cm:

- **Bón phân:** Bón 0,5-1 kg Urea + 1-2 kg Super lân + 0,51 kg kali sunfat / cây. **Chú ý:** Tuyệt đối không bón phân có clo khi cây đang có quả.
- Pha 35 ml **Đậu trái C.A.T** / 8 lít, phun sương 1 lần.
- Tưới nước định kỳ để giữ cho đất đủ ẩm.

Khi đường kính quả khoảng 7 cm trở lên:

- **Tỉa và bao trái:** Mục đích là cho trái to, đẹp, cao cấp, bán được giá cao và còn hạn chế sâu, nấm phá trái. **Cách làm:** Khoảng 45 ngày sau đậu, cắt trái đeo xong phun thuốc trừ sâu bệnh có sẵn trên trái. 1 ngày sau dùng túi **MAI XUÂN** 40 x 50 cm bao trái lại, xiết chặt miệng bao.
- **Bón phân:** Bón 1 kg Urea + 1-2 kg kali sunfat / cây
- Phun Dưỡng trái (35 ml / 8 lít) + F.Bo (15 g / 8 lít) định kỳ 15 ngày / lần để nuôi trái.
- Bổ sung: trước thu 1 tháng, phun Nutrimix (15 ml / 8 lít) + Dưỡng trái (35 ml / 8 lít) giúp trái màu sáng, chống nứt vỏ, ngọt trái, chống sượng và tăng chất lượng trái.

Xin liên hệ Kỹ sư Trúc: (08) 9967677 0913.909800

MAI XUÂN Đi lên cùng nhà nông!