



# MAI XUÂN XỬ LÝ RA HOA-ĐẬU TRÁI-NUÔI TRÁI NHÃN

## I. SAU THU HOẠCH:

- Bón phân phục hồi: khoảng 300 g Urê + 1 kg lân + 10-20 kg phân chuồng / cây 3 tuổi và tưới nước.

- Cắt tỉa cành vượt, sâu bệnh và cắt đều các ngọn cành tạo tán và độ thông thoáng cho cây.

- Hiện nay Nhãn Tiêu da bò miền Đông đang bị bệnh “đọt chổi” phổ biến, theo kết luận sơ bộ ban đầu là cây bị bệnh do virus *Phytoplasma* và yếu tố liên quan đến sự phát sinh phát triển của bệnh chủ yếu do nhện, bọ xít nhãn, bọ trĩ ... và côn trùng chích hút khác. **Cách khắc phục:** Cắt bỏ cành bị bệnh càng sớm càng tốt và vết cắt nằm dưới đoạn bị bệnh khoảng 20cm (đoạn bị bệnh có lá bị xoắn, ngọn như cái chổi, nếu có ra hoa thì hoa cũng bị xoắn, trái rất nhỏ, ít và lõi bị màu đen, thỉnh thoảng thấy có vài vết chích trên lá hoặc cành do côn trùng) hoặc tỉa toàn bộ nhánh nhỏ để tạo tán lại. Cắt bỏ đoạn bệnh xong phun thuốc trừ sâu nhện xen kẽ với Kumulus 5-7 ngày / lần để khống chế quần thể sâu, nhện hại ký sinh chích hút lây lan virus. Nên pha thêm Food-MX1 (35-5-5+5MgO): 15 g / 8 lít để giúp tược non vươn mạnh, vượt qua giai đoạn này. Tiêu huỷ đồng loạt toàn bộ cành bị bệnh tránh lây lan nguồn bệnh, bảo vệ tược non không bị nhiễm bệnh trở lại.

## II. XỬ LÝ RA HOA:

### 1. NHÃN TIÊU DA BÒ: Làm 3 bước sau:

#### + Bước 1: Bón phân đón ra hoa và phun thuốc tạo mầm hoa:

- Khi coi cuối (coi cuối là coi xử lý ra hoa, thường là coi 2 hoặc coi 3) vừa nhú, bón phân đón ra hoa: Khoảng 400 g DAP+ 50 g KCl/cây tán 3 m.

- Khi lá coi cuối màu hồng nhạt, phun sương F.Bo-Bột Ra Hoa: 15 g hoặc Food-MX2 (5-50-5+0,5B) / 8 lít giúp coi dẫn lông, ức chế đọt rặng, cây dễ ra hoa.

#### + Bước 2: Kích thích ra hoa. Có 3 cách :

- **Cách 1-Khắc cành:** Khi lá coi cuối vừa chuyển sang màu xanh nhạt, khắc 90% số cành trên cây, rộng 6-10 mm, để lại 10% số cành làm cành thử. Dùng Ridomil hòa sệt bôi vào vết khắc, không cần quấn dây nylon. Nếu không yên tâm, nhà vườn cứ quấn dây nhưng sau 25 ngày phải tháo dây vì cây đã hay chưa ra hoa. Vết khắc ở trên vết khắc cũ khoảng 1 tấc trở lên. Còn 10% cành còn lại, khi cây đã đậu trái có thể khắc số cành này cho ra hoa luôn để khỏi bị ra cành non, ảnh hưởng xấu khi nuôi trái.

- **Cách 2-Xử lý KClO<sub>3</sub>:** Khi lá coi cuối vừa chuyển sang xanh nhạt, xử lý KClO<sub>3</sub> cho cây. Lượng KClO<sub>3</sub> trung bình khoảng hơn 120 g cho 1 cây đường kính 3 m. Rải hoặc tưới (pha 120 g KClO<sub>3</sub> trong 10 lít) vào vùng đất cách gốc 5-7 tấc đến ngoài cùng tán cây.

- **Cách 3- Xử lý KClO<sub>3</sub> rồi khắc nhẹ:** Khi lá coi cuối vừa chuyển sang xanh nhạt, xử lý KClO<sub>3</sub> cho cây. Lượng KClO<sub>3</sub> và cách xử lý như trên, tưới nước 2 ngày / lần cho thuốc tan xong 1 tuần sau khắc nhẹ cho cây, vết khắc 4-5 mm và không cần quấn dây. Cách này thường áp dụng cho những cây khó ra hoa, những cây đã “làm trái” năm thứ 3 trở lên rồi.

#### + Bước 3: Phun thuốc thúc Nhãn ra hoa:

Sau khi khắc cành hoặc xử lý KClO<sub>3</sub> 1 tuần, pha 35 ml RA HOA C.A.T (2 nắp lưng) + 15 g F.Bo-Bột Ra Hoa hoặc Food-MX2 (5-50-5+0,5B) / 8 lít, phun sương đều tán cây và trong thân 2 lần (5-7 ngày / lần) để thúc Nhãn ra hoa đồng loạt, giúp phát hoa dzọt ra mạnh, hoa khoẻ, dễ đậu trái.

## 2. CÁCH XỬ LÝ CÁC GIỐNG NHÃN KHÁC:

### a. Nhãn Xuồng cơm vàng, Xuồng cơm trắng:

Sau thu hoạch cần cắt tỉa cành đồng loạt, tưới nước bón phân và chăm sóc cho cây ra coi đọt tốt.



Khi 2/3 số lá của coi đợt 2 đã chuyển từ màu vàng chanh sang màu xanh đậm thì khắc nhẹ 2/3 số cành (vết khắc hẹp, khoảng 4-5 mm và không được khắc phạm vào lớp vỏ lụa của cây). Đồng thời, phun **RA HOA C.A.T + F.Bo** theo liều lượng như ở Nhân da bò cho cây. Ngưng tưới nước, đợi khi cây nhú hoa rồi tưới lại. Có thể thay khắc nhẹ bằng khứa 1 đường quanh cành (tức làm đứt 1 vòng quanh cành mà thôi).

- Ở Bến Tre, hái xong nhà vườn cắt các cành đã cho trái, chừa cành chưa cho và bón phân tưới nước, phun thuốc **RA HOA C.A.T + F.Bo**, các cành này sẽ trở hoa "vụ chết". Năng suất chỉ = 20-30% vụ chính nhưng giá gấp 2, tạo thêm thu nhập. Ở Bà Rịa, cắt bỏ các phát hoa mới nhú của vụ chính. Tiếp tục tưới nước và bón phân gốc, tưới mới hình thành đến khi già thì ngưng tưới và phun thuốc như trên, cây sẽ cho trái trễ vụ 2-3 tháng, năng suất vẫn cao và giá cao.

**b. Nhân Thái Lan, Trung Quốc, Nhân lông Hươu yên:** Rải hoặc tưới **KClO<sub>3</sub>** + phun **RA HOA C.A.T + F.Bo-Bột Ra Hoa**.

**c. Nhân Long, Super:** 1 năm có thể xử lý 2 vụ: Sau thu hoạch cắt tỉa cành- bón phân- khắc cành nhẹ (hoặc chỉ khứa 1 đường) - phun **RA HOA C.A.T + F.Bo-Bột Ra Hoa**.

### **III. XỬ LÝ ĐẬU TRÁI:**

Để Nhân đậu trái tốt, đậu đều tán, trái to hẳn khi vừa mới đậu, cần xử lý như sau:

**-Lần 1 - Phát hoa dài 5-10 cm:** Pha 35 ml **ĐẬU TRÁI C.A.T** + thuốc sâu Cypermethrin (Sherbush 25ND, Cymerin, Sec Sài Gòn, Cyrux...) / 8 lít, phun sương đều phát hoa và tán cây.

**-Lần 2 - Phát hoa dài hết cỡ, hoa sắp nở:** Pha 35 ml **ĐẬU TRÁI C.A.T** + 30 g Dithan-M45 (hoặc thuốc Carbendazim như Carbenzim, Vicarben...) / 8 lít phun sương đều phát hoa và cây.

**-Lần 3 - Trái to bằng hột sen:** Pha 35 ml **ĐẬU TRÁI C.A.T** + thuốc sâu Cypermethrin / 8 lít, phun sương đều tán cây.

**Chú ý:** Khi cây nhú hoa rồi cần tưới nước nếu cây thiếu nước cho phát hoa nhú mạnh nhưng không nên bón phân gốc nhiều vì dễ gây sốc, ảnh hưởng xấu đến quá trình thụ phấn và trái non sau này. Còn cách xử lý **KClO<sub>3</sub>** cần phun bổ sung trên lá kịp thời, nếu không hiện tượng rụng trái non xảy ra nặng.

### **IV. NUÔI TRÁI:**

#### **1. Bón gốc:**

- Khi trái bằng ngón tay út đến hòn bi: Bón khoảng 150 g NPK 20.20.15 / 15 ngày / lần.

- Khi trái bằng hòn bi (vừa chuyển da bò) đến thu hoạch: Bón khoảng 100 g NPK 20.20.15 + 20 g Ca(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> / lần / 10 ngày.

#### **2. Bón lá và tẩy trái:**

- Khi trái bằng hột đậu đến hòn bi: Muốn trái to nhanh, ít rụng pha **DƯỠNG TRÁI**: 35 ml + 15 g **Food-MX4 (10-0-35+3Ca)** / 8 lít, phun 10 ngày / lần.

- Khi trái vừa chuyển da bò: Phun **DƯỠNG TRÁI**: 35 ml + 15 g **Food-MX4 (10-0-35+3Ca)** / 8 lít, 10 ngày / lần giúp trái to, chắc, ngọt, sáng đẹp, chống nứt vỏ, tăng chất lượng trái.

- Neo trái: Phun **DƯỠNG TRÁI**: 35 ml + **NUTRIMIX**: 15 ml / 8 lít, 5-7 ngày / lần giúp neo trái.

- Tẩy trái: Để trái có màu sắc sáng bóng pha 10 ml **Bavistin** + 35 ml **DƯỠNG TRÁI** phun 7 ngày / 1 lần và ngưng tưới nước trước khi thu 1 tuần.

- Chống hiện tượng nứt trái: Thường khi mưa nhiều mà bón dư đạm, thiếu Ca hay bị hiện tượng nứt trái hàng loạt. Cách khắc phục: Khi trái còn nhỏ nên phun trên lá chế phẩm: **Food-MX4 (10-0-35+3Ca)**... Đồng thời, bón cân đối NPK và đừng để cây khô hạn trong quá trình nuôi trái.

Hộp thư Tư vấn Kỹ thuật: 56/103-Cây trâm-P.11-Gò Vấp-Tp.HCM ĐT: (08) 9967 677 - 5894 930

KS Trúc: 0913.909 800 - KS Chương: 0918.763 851

Mai Xuân - Đi lên cùng nhà nông! (tháng 3-2004)