



DƯA HẤU LAI F1 AN TIÊM



Tăng trưởng mạnh.



Chống chịu tốt.



Năng suất cao.



Rất ngon ngọt.


AN TIÊM 94 : Trái tròn, to, nặng 6-8 kg, vỏ xanh có sọc đậm, ruột đỏ, rất ngon ngọt.

**SẢN PHẨM ĐẠT HUY CHƯƠNG VÀNG HỘI CHỢ
TUẦN LỄ XANH QUỐC TẾ - VIỆT NAM NĂM 2000**



AN TIÊM 98 : trái tròn, to, nặng 7-9kg, vỏ xanh, sọc đậm, ruột đỏ, rất ngon ngọt

AN TIÊM 95: trái tròn, to, nặng 7-8 kg, vỏ đen có sọc mờ, ruột đỏ, rất ngon ngọt.




AN TIÊM 100 : trái tròn, vỏ xanh, sọc đậm, nặng 3-4kg, ruột vàng, rất ngon ngọt

GIỐNG MỚI



AN TIÊM 101 : trái tròn cao, nặng 3-4kg, vỏ đen có sọc mờ, mỏng, ruột đỏ đẹp, thịt mịn, rất ngon ngọt

GIỐNG MỚI



AN TIÊM 102: trái dài, nặng 3-4 kg, vỏ màu xanh đậm, mỏng, ruột đỏ đẹp, rất ngon ngọt.

GIỐNG MỚI



AN TIÊM 103 : trái dài, nặng 3-4kg, vỏ đen có sọc mờ, mỏng, ruột chắc, đỏ đẹp, rất ngon ngọt

KỸ THUẬT TRỒNG DƯA HẤU AN TIÊM F1

- 1. THỜI VỤ :** Các giống dưa An Tiêm đều thích hợp trồng vụ Noel (gieo từ 20/9 đến 1/10 dương lịch), vụ Tết (gieo từ 7 - 10 tháng 10 âm lịch), và vụ lạc hậu sau Tết. Riêng dưa trái dài có thêm ưu thế trồng các vụ mùa mưa.
- 2. GIEO GIỐNG :** Gieo thẳng : mỗi lỗ bỏ 1-2 hạt (tỉa còn 1 cây), sâu 2cm, phủ hạt bằng tro ẩm. Cần 1 kg hạt/ha. Gieo bầu : cần 0,5 kg hạt/ha. Nên nén chặt đất ở đáy bầu, rồi pha 20-30 gam Derosal, Carbendazim, Monceren trong 10 lít nước, tưới 2m² bầu đất trước khi gieo. Phơi hạt ngoài nắng nhẹ 1 giờ rồi đem ngâm trong nước ấm (2 sôi 3 lạnh). Thời gian ngâm An Tiêm 94, 95, 98 trong 4-6 giờ, An Tiêm 100, 101, 102, 103 ngâm trong 7-8 giờ, ủ nơi ẩm trong 48 giờ, thấy hạt nhú mầm thì đem gieo mỗi bầu 1 hạt. Để bầu nơi nhiều nắng. Trồng vụ mưa, cần làm dàn che khi mưa.
- 3. ĐẤT TRỒNG VÀ KHOẢNG CÁCH GIEO:** Nên chọn đất mà vụ trước không trồng các loại dưa bầu bí. Xử lý đất với 500 kg/ha vôi bột trước khi lên líp 5-7 ngày. Khoảng cách gieo: luống đôi rộng 5m, trồng 2 hàng, cây cách cây 40 cm với giống An Tiêm 100, 101, 102, 103 (mật độ 10000 cây/ha) và 45-50 cm với An Tiêm 94, 95, 98 (mật độ 8000 cây/ha).
- 4. ÁP DỤNG MÀNG PHỦ ĐẤT :** rất có lợi vì giảm công làm cỏ, nước tưới, hạn chế sâu bệnh, nên giảm giá thành sản xuất, nhưng năng suất cao hơn, ổn định hơn. Dùng bạt khổ 90 cm, nhớ để mặt trắng hướng lên trên.
- 5. BÓN PHÂN :** 1 ha cần 250 kg DAP, 220 kg Urê, 130 kg KCl và 20 khối phân chuồng hoai, chia ra như sau :

Loại phân (Đơn vị)	Cả vụ	Bón lót	Tưới thúc	Bón thúc 1	Bón thúc 2	Bón thúc trái	Tưới nuôi trái
Phân chuồng (Khối)	20	20					
DAP (kg)	250	30	25	50	70	50	25
Urê (kg)	220	-	25	50	50	70	25
KCl (kg)	130	20		30	30	30	20
Furadan (kg)	30	10		10	10		

Ghi chú : Tưới thúc cây 1-2 lần sau khi đặt bầu 5-6 ngày, bón thúc 1 lúc 12-15 ngày sau trồng, thúc 2 lúc 20-25 ngày sau trồng, bón thúc trái và tưới nuôi trái giai đoạn trái đang lớn. Giữa bón thúc 1 và 2, tưới thúc thêm 20-30kg Urê + DAP pha loãng.

6. TƯỚI TIÊU : Trời nắng tốt nên tưới 1-2 lần/ngày vừa đủ ẩm. Luống phải cao để bảo đảm thoát nước tốt khi mưa. Phun phân bón lá hữu cơ SUPERMES (nồng độ 8-10 cc/ 10 lít) giai đoạn dưa tăng trưởng để tăng năng suất.

7. TỈA NHÁNH VÀ THỤ PHẤN LẤY TRÁI:

Trước khi thụ phấn, tỉa bớt nhánh bơi, chỉ để 1 dây chính và 1 dây chèo. Thụ phấn nhân tạo (úp hoa đực của cây bên cạnh lên trái mình chọn) từ 7 đến 10 giờ sáng để trái đều. Các giống An Tiêm 94, 95, 98 chọn trái thứ 2-3 trên dây chính, các giống 100, 101, 102, 103 chọn từ trái thứ 3 trở đi, trái có cuống to, dài, nụ to, tròn đầy, không sâu bệnh để trái lớn nhanh, cắm cây làm dấu trái chọn để dễ tỉa bỏ sớm các trái khác. Quá trình trái phát triển, nên kê trái và trở trái để trái lớn đều, màu vỏ đẹp, không bị mối hay sâu bệnh phá hại.

8. PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH:

- **Bọ dưa :** Phun Sevin (10g/8 lít) hay Trebon (15cc/8 lít).
- **Sâu vẽ bùa :** Phòng trị bằng Polytrin hay Karate (15cc/8 lít).
- **Bọ trĩ :** Kiểm tra từng ngày mặt dưới các lá ngọn, thấy bọ trĩ (rầy lửa) xuất hiện, phải phun ngay 1 trong các thuốc Confidor, Lannate, Danitol hay Regent. Phòng trị triệt để rầy sớm để dưa không bị bệnh ngù đọt (bẩn máy bay).
- **Héo cây con :** Do nấm Rhizoctonia và Pythium sp. Tránh đặt cây sâu, tưới và phun ngừa định kỳ với Copper B, Benlate C, Rovral, Derosal, Ridomil, Topsin M...
- **Bệnh đốm lá gốc/ nứt thân chảy mủ :** Do nấm Mycosphaerella. Phòng trị bằng Monceren, Copper B, Derosal, Mancozeb. Bệnh dễ lây lan khi bón nhiều phân đạm.
- **Bệnh cháy lá giữa thân/ sượng mai :** Do nấm Phytophthora. Phòng trị bằng Curzate M8, Metalaxyl, Mancozeb, Ridomil, Aliette. Bệnh nặng trong điều kiện ẩm ướt (sương mù, mưa ...), dư đạm.
- **Bệnh héo dây :** Do nấm Fusarium và vi khuẩn Pseudomonas solanacearum. Bệnh khó trị nên cần phòng bằng cách tưới & phun định kỳ Copper B, Benlate C, Derosal, Rovral, Topsin M, Ridomil và nhổ bỏ ngay cây bệnh.
- **Bệnh thán thư :** Do nấm Colletotrichum. Bệnh xuất hiện trên lá, thân, trái. Bệnh trên trái có vết lõm sâu, nâu sậm, sau thành lớp nhầy. Phun ngừa với Daconil 2%, trị với Ridomil, Metalaxyl, Dithane M45, Curzate.

9. THU HOẠCH: Thu dưa khi trái chín 75-90% để vận chuyển xa. Cần ngưng tưới nước, thúc phân 5 ngày trước khi thu. Dưa AN TIÊM 94, 95, 98 cho năng suất 30-35 tấn/ ha, các giống AN TIÊM 100, 101, 102, 103 cho thu hoạch 55-60 ngày sau khi gieo, năng suất 25-30 tấn/ ha.

LƯU Ý:

- * Dưa An Tiêm là giống lai F1 nên không thể sử dụng hạt của trái thương phẩm làm giống cho vụ sau.
- * Hạt giống có xử lý thuốc, không ăn được.