

# Bưởi Diễn - "mỏ vàng" lơ lửng giữa trời

**B**ưởi Diễn có nguồn gốc từ Đoàn Hùng, là loại quả chứa hàm lượng Vitamin C cao, được nhiều người ưa chuộng. Bưởi Diễn sinh trưởng khỏe, chống chịu sâu bệnh tốt và cho năng suất cao trong môi trường đất có mực nước ngầm cao. Bưởi Diễn hiện đang được trồng nhiều ở các vùng Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hà Nội. Ở các xã Phú Diễn, Minh Khai của huyện Từ Liêm, diện tích trồng bưởi lên tới hàng trăm ha, là nguồn thu nhập chính đối với một số hộ nông dân ở đây. Gia đình anh Nguyễn Văn Cường (Phú Diễn) trồng 2880 m<sup>2</sup> cho thu nhập khoảng trên dưới 100 triệu đồng/năm. Gia đình bà Hảo với 1800m<sup>2</sup> đã cho thu hoạch 6 năm, cho biết: "những năm thất thu như năm nay cũng cho thu nhập khoảng 40 triệu đồng".

Bưởi Diễn thường chín muộn, kịp bán vào dịp tết. Trọng lượng trung bình từ 0,9 - 1,1 kg/quả, có hình tròn dài, có màu vàng sáng khi chín, trung bình khoảng từ 10 - 11 múi, 60 - 70 hạt/quả. Nếu được chăm sóc tốt từ năm thứ năm trở đi, có thể cho từ 160 - 200 quả/cây. Theo ông chủ tịch xã Phú Diễn, do điều kiện đất đai của một xã ven đô rất hạn chế, nên tuy biết đây là loại cây mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhưng xã cũng đành chịu vì chẳng biết phát triển vào đâu.

Hy vọng qua đây Bưởi Diễn sẽ càng được phát triển nhân rộng hơn ở những vùng có điều kiện về đất đai như Hà Tây, Vĩnh Phúc...

## KỸ THUẬT TRỒNG VÀ PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH


**Đất trồng:** Đất phù sa ven sông hoặc đất rừng mới khai hoang, cổ tầng dày từ 80 - 100 cm, có hàm lượng mùn cao, thoát nước tốt, mực nước ngầm dưới 50 cm. Mật độ trồng 3x4m, khoảng 900 - 1000 cây/ha đối với cây ghép.



Hố đào rộng 40x40 cm. Đất đào lên trộn đều với công thức: 30kg đất + 0,4kg lân + 0,2kg kali/hố. Lấp hố trước khi trồng 15 - 20 ngày, khi trồng đào lại hố, nhỏ và sâu, rộng hơn bầu cây 10cm. Đặt cây thẳng, lấp đất cao hơn bầu cây 15cm, nén đất chặt và tưới nước thường xuyên để giữ ẩm. Mùa khô phủ rơm rác dày từ 5 - 10 cm, cách gốc 10 cm phòng thối rễ. Trồng vào khoảng tháng 2 đến tháng 10 hàng năm.

**Bón phân:** Căn cứ vào đất và sự sinh trưởng của cây (sản lượng thu hoạch/năm), lượng bón trung bình như sau:

+ Cây từ 1 - 4 tuổi: phân chuồng 30kg + phân lân 0,2kg vào cuối mùa sinh trưởng (tháng 11 đến tháng 1). Bón đạm và kali vào các tháng trong năm: Lần 1 từ tháng 1 - 2, tỉ lệ 0,3kg urê + 0,4kg kali/cây. Lần 2 từ tháng 4 - 5, tỉ lệ 0,4kg urê + 0,6kg kali/cây.



Lần 3 từ tháng 8 - 9 bón 0,3kg urê/cây.

+ Cây từ 5-8 tuổi: Phân chuồng 40kg + 0,5kg vôi bột/cây/năm (sau thu hoạch). Tháng 1 - 2 bón 0,6kg urê + 0,4kg kali/cây. Tháng 5 - 6 bón 0,4kg urê + 0,6kg kali/cây. Cách bón: Rắc cách gốc cây 30 - 40 cm, phủ một lớp đất bột mỏng và rơm rác sau đó tưới nước. Tránh phủ đất quá

dày, sát gốc gây thối gốc cây.

+ Vi lượng phun thuốc qua lá: Magiê nitrat 1kg + 100 lít nước; Kẽm sunfat 100g + 100 lít nước; Đồng sunfat 400g + 100 lít nước;

Borax 300g + 100 lít nước; Mangan sunfat 100g + 100 lít nước. Chú ý: Phun chủ yếu vào mùa xuân khi cây ra lá non, tất cả phun đều ướt đầm lá.

+ Tưới nước: Là biện pháp chống hạn tích cực nhất.

**Phòng trừ sâu bệnh:** Bưởi

Diễn thường gặp phải một số loại sâu bệnh sau:

+ Sâu vẽ bùa: thường phá hoại ở thời kỳ vườn ươm (khoảng 3 - 4 tuổi), xuất hiện vào tất cả các tháng trong năm. Cần phun Nicotex 1 - 2%, Đexit 1% từ 1 - 2 lần khi cây có lộc non.

+ Sâu đục thân, cành xuất hiện vào các tháng từ 5-9 trong năm. Trị bằng cách bơm Ditorax vào lỗ đục.

+ Nhện đỏ và nhện trắng: Chống bằng thuốc Morocrotophos 1 - 2% + Methamidophos 1 - 2%.

+ Rệp phá hạt vào các mùa hè, thu: Phòng trị bằng Bi 58 hoặc Trebon nồng độ 2% vào lúc lá non.

+ Ruồi đục quả: Xuất hiện vào lúc quả chuẩn bị chín. Phương pháp thủ công là bắt ngòi chích hút vào ban đêm, bằng cách dùng Metyleuzenol pha loãng cùng Nales 5% bôi vào mặt cắt của quả rụng bỏ đôi treo trên cành để dẫn dụ ruồi đục. Có thể dùng Diptorex phun nồng độ 0,5%.

+ Bệnh loét quả: Dùng Boocđo phun nồng độ 5%.

+ Bệnh chảy gôm: phát sinh gần gốc làm thối gốc và rễ cây. Phòng bằng cách chọn gốc ghép chống bệnh hoặc dùng Boocđo bôi vào vết bệnh sau khi lau sạch nhựa, sau đó quét nhựa đường lên trên.

+ Bệnh virút Greening, Tristera: Phòng bằng cách thâm một cành cao, chọn giống sạch, phun trừ rệp và rận trước. □

HT

## Nghề rừng rợn...

(TIẾP THEO TRANG 24)

Nỗi tự ti, mặc cảm nghề nghiệp luôn thường trực trong họ. Có anh mới cưới vợ xong vẫn giấu không cho gia đình đang vợ biết. Anh nói với đồng nghiệp rằng chờ đến khi nào có con cái ràng buộc gia đình thì mới kể cho vợ hay. Mọi người đều cảm thông và tôn trọng ý kiến này. Còn hiện tại, điều bí mật kéo theo tâm lý "bất an" trong khi làm việc vẫn còn đeo đẳng anh ta, có khi hết cuộc đời này thì điều bí mật kia chắc gì đã được nói ra!?

Thật cảm thông và chia sẻ cho những con người làm công việc khâm liệm trong những nhà tang lễ. Công việc của họ đang làm thật cao cả và có ý nghĩa với đời. Ra về, tôi chủ động bắt tay từng người, nhưng họ có vẻ rụt rè khi đưa tay ra bắt. Những đôi bàn tay chai sần, ấm nóng. □