



VIỆN CHĂN NUÔI
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VỊT
ĐẠI XUYỀN



VỊT CHUYÊN TRỨNG
Khaki Campbell

Địa chỉ: Phú Xuyên Hà Tây
ĐT: (034) 854391 854250 * Fax: (034) 854390
Email: thcvy@hn.vnn.vn
nguyenductiong04@yahoo.com

3. Lịch phòng bệnh cho vịt:

Ngày tuổi	Thuốc và cách dùng
1-3 ngày tuổi	- Dùng thuốc phòng chống nhiễm trùng rốn, các bệnh đường ruột và ảnh hưởng các tác nhân Stress - Streptomycin 3-4mg/con - Neotesol, Tetraxycin. Ampi-Coly 40-50mg/kgP. - Bổ sung VTM hay dầu cá.
10-15 ngày tuổi	Tiêm phòng vắc xin dịch tả lần 1, tiêm dưới da.
18-21 ngày tuổi	Bổ sung VTM và kháng sinh
56- 60 ngày tuổi	Tiêm phòng vắc xin dịch tả lần 2
70-120 ngày tuổi	Chú ý sự biến động về thời tiết, sức khoẻ đàn vịt để bổ sung kháng sinh, phòng bệnh cho vịt 1-2 tháng 1 lần nhưng phải thay đổi loại thuốc dùng.
130-140 ngày tuổi	Tiêm vắc xin dịch tả lần 3, bổ sung kháng sinh và VTM . sau khi vịt đẻ 4-5 tháng tiêm vắc xin dịch tả lần 4 và phòng kháng sinh đối với các bệnh do vi trùng 1-2 tháng/lần.

Thức để bằng cua, ốc, đầu tôm, chần thả tự do, và cho ăn thêm 120-130gam thức/ con/ ngày, luôn đảm bảo nước uống sạch và đủ.

5. Kiểm tra khối lượng vịt:

8 tuần tuổi khối lượng vịt đạt từ 0,9-1,2kg/ con
20 tuần tuổi khối vịt đạt 1,6-1,8 kg/ con
Phải loại những con quá to hoặc quá nhỏ. Vịt vào đẻ ghép tỉ lệ đực mái là 1 đực 8-10 mái.

6. ánh sáng:

Trước khi vịt đẻ 5 tuần tăng dần thời gian chiếu sáng sao cho đến khi vịt đẻ và suốt thời gian đẻ, thời gian chiếu sáng đạt 16-18 giờ ngày.



Đặc điểm giống vịt chuyên trứng Khaki Campbell

Là một giống vịt chuyên trứng đã được nuôi ở nhiều nước trên thế giới, vịt được nhập vào nước ta từ năm 1990. Vịt có thân hình nhỏ, lông màu khaki, mỏ và chân màu xám, một số chân và mỏ có màu da cam. Nhiều nơi trên cả nước miền núi, đồng bằng, trung du và ven biển đã nuôi giống vịt này đạt kết quả cao.

Tuổi vịt bắt đầu đẻ 140-145 ngày.

Khối lượng khi đẻ 1,6-1,8 kg. Trưởng thành 1,8-2kg/con.

Năng suất trứng bình quân 260-300 quả/mái/năm, cá biệt có đàn đạt 320 quả/mái/năm.

Khối lượng trứng 65-70 g/quả.

Tỷ lệ phôi 90-98%, tỷ lệ ấp nở trên 85%.

Tỷ lệ nuôi sống 98%.

Vịt thích hợp với phương thức nuôi chăn thả kết hợp xen canh lúa-vịt, cá-vịt. Ngoài ra có thể nuôi trên khô theo phương thức nuôi công nghiệp, nuôi khô trên vườn cây.

Kỹ thuật nuôi

1. Chuồng nuôi:

Đảm bảo thoáng về mùa hè, ẩm áp về mùa đông, có chất độn chuồng bằng phoi bào hoặc trấu khô, hoặc rơm, rạ không bị hôi, mốc.

Nhiệt độ nuôi thích hợp:

+ 28-32°C (trong 3 ngày đầu) và giảm dần xuống.

+ 20-22°C từ ngày thứ 10 trở đi.



19 tuần trở đi: Protein: 17%, năng lượng 2.700kcal

4. Cho ăn:

1-7 ngày tuổi cho ăn 80-100 gam/con/tuần.

8-14 ngày tuổi cho ăn 250-300 gam/con/tuần.

Tập dần cho vịt xuống nước.

15-21 ngày tuổi cho ăn 400-450 gam/con/tuần và tập cho ăn thóc luộc. Khi vịt quen ăn thóc đuổi đi chân thả trên đồng và cho thêm thức ăn bổ sung.

22-70 ngày lượng thức ăn cần cho vịt 74g/con/ngày

70-90 ngày cho ăn bổ sung 60-65 gam/con/ngày.

90-120 ngày cho ăn bổ sung 80-90 gam/con/ngày.

120-140 ngày cho ăn bổ sung 100-110 gam/con/ngày.

