
NUÔI CÁ ĐIỀU HỒNG SAU VỤ TÔM

Cải tạo ao:

Sau khi đã thu hoạch tôm, tháo cạn nước, nếu ao không thoát tự nhiên thì phải dùng máy bơm bơm hết nước và hút bùn nhão dưới đáy ao ra ngoài. Tiến hành phơi đáy ao từ 5 – 7 ngày, để diệt cá tạp và mầm bệnh. Dùng vôi bột rải xuống ao với lượng 10 – 20 kg/100 m², sau đó lấy nước vào ao từ 0,3 – 0,5 m qua lưới chắn tạp hoặc túi lọc tạp, túi lọc tạp làm bằng vải Kate 4 lớp, miệng túi gắn vào ống với đường kính 0,5 – 1 m, chiều dài túi 7 – 15 m, miệng túi thả tự do trong ao có đường kính 2 – 3 m. Dùng phân chuồng heo, gà, vịt rải đều khắp đáy ao với lượng 10 – 15 kg/100 m². Sau khi bón phân vài ngày thấy nước có màu xanh đợt chuôi là tốt, lúc này lấy thêm nước vào ao khoảng 1 – 1,5 m và tiến hành thả cá giống.

Chọn và thả giống:

Chọn con giống đồng đều cỡ, không bị mắc bệnh, phản xạ nhanh khi động mạnh vào nước. Nên chọn mua giống ở những trại sản xuất giống uy tín và chất lượng và tốt nhất là chọn cỡ cá từ 25 – 30 con/kg. Thả giống vào sáng sớm hoặc trời mát. Trước lúc thả kiểm tra các điều kiện môi trường như mật độ, độ pH... Tùy theo khả năng bổ sung thức ăn có thể thả 2 – 4 con/m² hoặc 5 – 7 con/m².

Cho ăn và chăm sóc:

Có thể tận dụng nguồn thức ăn ở địa phương sẵn có như: tôm tép tạp, cám,

cá tạp... đã chế biến và nấu chín kết hợp với thức ăn công nghiệp dạng viên sao cho có hàm lượng đạm từ 25 – 30% và cung cấp cho cá theo từng giai đoạn sinh trưởng. Mỗi ngày cho ăn 3 lần vào sáng sớm 40%, trưa 20%, chiều mát 40% lượng thức ăn trong ngày. Cho ăn 3% trọng lượng cá lúc còn nhỏ, 2% lúc cá lớn. Cứ 10 ngày thay nước một lần, mỗi lần thay 30% lượng nước có trong ao và trong quá trình nuôi có thể linh động thay nước tùy vào chất lượng nước. Hàng tháng kiểm tra tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống để xác định lượng thức ăn hàng ngày.

Phòng ngừa bệnh:

Chủ động dùng thuốc kháng sinh bổ sung vitamin C theo định kỳ 10 ngày/lần bằng cách trộn vào thức ăn với liều lượng 2% tổng lượng thức ăn, không cho thức ăn ăn thừa, ôi thiu. Nguồn nước phải sạch không bị ô nhiễm. Theo dõi các hiện tượng bệnh và xử lý kịp thời, thường xuyên theo dõi kiểm tra môi trường nước.

Thu hoạch:

Khi cá đạt kích cỡ thương phẩm từ 350 – 400 g/con trở lên là có thể tiến hành thu hoạch được bằng lưới vây là tốt nhất.

Nguồn: Diễn đàn Nuôi trồng thủy sản, 2/2006.

CHĂN THẢ VỊT SIÊU THỊT C.V SUPER M

Vịt C. V. Super M là giống vịt chuyên thịt cao sản, thích hợp với