



MAI XUÂN

Giúp TIÊU ra hoa – đậu trái tốt & tăng sản lượng

Năm nay, thời tiết vài nơi khá khắc nghiệt mà Tiêu đòi hỏi sự chăm sóc đầy đủ và hợp lý hơn. Vì vậy nhà vườn Tiêu cần làm các bước sau:

I. SAU THU HOẠCH: Có 3 công việc cần làm:

- **Bón phân phục hồi – tưới nước:** Bón khoảng 0,5 kg NPK 16.16.8 + 10 kg phân hữu cơ vi sinh + 0,5 kg vôi cho mỗi nọc. Phân hoá học đơn có thể bón 200 g Urê + 500 g Super lân + 50 g KCl.
- **Cắt tỉa cành:** cắt bỏ những nhánh không có cành ngang, những dây lươn yếu ớt và cắt ngắn đoạn đọt trên cùng để khống chế chiều cao và kích thích dây chính ra nhiều nhánh ác cho trái sau này.
- **Phun trên lá và tưới gốc:** định kỳ 10 ngày / 1 lần chế phẩm F.Bo-Bột Tốt Rẽ: pha 15 g / 8 lít giúp bộ rễ đậm mạnh, cây phục hồi nhanh và sẽ ra hoa tốt (có thể cộng thêm NUTRIMIX). Nếu cần lá sung tốt thì phun Food-MX1 (35-5-5+5Mg): 15 g/8 lít.

II. GIÚP TIÊU RA HOA TỐT:

Khi Tiêu bắt đầu nhú đọt non, hoa và sáp ra đọt hoa rõ (lứa hoa chính thường ra đầu mùa mưa):

- **Bón phân đón ra hoa:** thường vào đầu mùa mưa bón khoảng 0,5 kg NPK 16.16.8 hoặc 200 g DAP + 50 KCl cho mỗi nọc. Nếu có điều kiện nên phun sương F.Bo-Bột Ra Hoa (15 g / 8 lít) vào đầu mùa mưa giúp Tiêu tượng hoa tốt.
- **Rong rỉ:** Rong rỉ cành lá của nọc sống cho thông thoáng vì lúc này tiêu cần ánh sáng.
- **Khô hạn:** Sau thu hoạch bón phân và tưới nước đều đặn đến khoảng giữa tháng 5 thì ngưng tưới (cắt nước), cây cần một thời gian khô hạn nhẹ, để ra hoa tập trung vào đầu tháng 6, khi mùa mưa bắt đầu.
- **Thúc ra hoa rõ:** Pha 15 g F.Bo-Bột Ra Hoa / 8 lít phun sương ướt đều nọc tiêu 1 lần khi Tiêu nhú đọt non và bắt đầu ra hoa rõ => giúp ra hoa sớm và đồng loạt, mầm hoa mập, mạnh.

III. GIÚP TIÊU ĐẬU TRÁI:

Phun thuốc ĐẬU TRÁI cho tiêu 2 lần kết hợp bón phân đọt 3 để giúp tiêu đậu trái tốt và tăng sản lượng. Cụ thể phun thuốc như sau:

Lần 1: Khi gié hoa tiêu dài 3 - 4 cm (lứa hoa chính): pha 35 ml ĐẬU TRÁI – Chuyên dùng cho Tiêu (2 nắp lưng) trong 8 lít nước phun sương đều đọt lá, gié hoa non và cả cây.

Mục đích: giúp gié hoa vươn mạnh, tăng sức chống chịu cho hạt phấn, giúp tăng tỷ lệ đậu trái, chống hiện tượng “tiêu bồ cào” tức gié trái thưa do tỷ lệ đậu thấp, hạt kém phát triển.

Lần 2: Khi chuỗi hạt tiêu đã hình thành rõ, hạt tiêu đang lớn: pha 35 ml ĐẬU TRÁI – Chuyên dùng cho Tiêu / 8 lít phun sương ướt đều chuỗi hạt và cả cây.

Mục đích: cung cấp dinh dưỡng kịp thời cho chuỗi hạt tiêu, hạn chế hiện tượng rụng chuỗi trái tiêu non.

- **Bón phân:** khi trái đã hình thành bón lần 3, bón khoảng 0,5 kg NPK 16.16.8 /nọc.

- **Chú ý:**

1. Khi tiêu đang phơi bông, tỏa hương (hoa nở, đang thụ phấn) không nên phun gì cho tiêu cả. Hoa Tiêu là hoa lưỡng tính, sau khi hoa nở 3-5 ngày thì nhuy cái tiết mật sẵn sàng nhận phấn (nhuy cái có khả năng nhận phấn trong vòng 10 ngày, cao điểm là từ 3-5 ngày sau khi tiết mật), nhưng khi đó nhị đực của hoa đó chưa chín, chưa tung phấn được, nên nhuy cái muốn thụ phấn được phải nhận phấn của hoa bên cạnh hay hoa nở trước đó trên cùng một gié hoa. Đây là cách thụ phấn phổ biến nhất trên Tiêu.
2. Tiêu là cây thích ẩm mà không chịu úng. Trong thời gian Tiêu đang ra hoa nên tưới nước đầy đủ nhưng không quá nhiều. Tác động tưới phun, như những cơn mưa nhẹ giúp Tiêu tăng tỷ lệ đậu trái. Nhưng chú ý không tưới phun lên hoa đang nở rõ.
3. Sau đợt hoa chính có một số hoa lai rai ra sau. Các đợt hoa muộn này sẽ cạnh tranh dinh dưỡng với đợt hoa chính và mầm cành ác năm sau, do đó nếu đợt hoa chính đã đạt yêu cầu thì nên lặt bỏ những đợt hoa muộn vì chúng ít khi đậu trái và dễ bị rụng.

IV. NUÔI TRÁI (Nuôi hạt):

- **Bón phân:** khi trái đang lớn bón lần 4, bón khoảng 0,5 kg NPK 16.16.8 /nọc.

- **Phun trên lá:** Pha 35 ml DƯỠNG TRÁI – Chuyên dùng cho TIÊU / 8 lít phun sương trên lá và tưới gốc định kỳ 15 ngày / 1 lần (nên pha thêm 15 ml NUTRIMIX hoặc 15 g Food-MX4 (10-0-35+3Ca) cho bình 8 lít) => giúp hạt chắc, nặng (đạt trên 500 g / 1 lít), đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

V. PHỤC HỒI NHANH VƯỜN TIÊU:

- Tiêu bị tuyến trùng hoặc rệp sáp chích hút gây bướu rễ, sưng rễ, mỏ đường cho nấm xâm nhập gây thối rễ, làm cây bị vàng vọt, sinh trưởng kém, sản lượng giảm, không bắt phân...

=> Pha 15 ml NUTRIMIX + 15 g F.Bo-Bột Tốt Rễ / 8 lít phun sương trên lá và tưới gốc định kỳ 7 ngày / 1 lần giúp bộ rễ mọc mạnh, rễ ký sinh bám chặt, cây vươn đọt mập, sung sức, lá chuyển từ vàng bạc sang xanh đậm, trái bóng, hết rụng chuỗi.

Chú ý:

- . Giúp rễ non mọc mạnh pha 15 g F.Bo / 8 lít để tưới vào 4 gốc.
- . Đào mương thoát nước mùa mưa nhưng tránh làm tổn thương bộ rễ để ngăn ngừa bệnh lây lan.
- . Đối với dây bệnh đã chết đào lên đốt hoặc chôn, đồng thời rắc vôi vào hố cây bệnh để khử trùng.

Hộp thư Tư vấn Kỹ thuật: 56/103 - Cây trâm, P.11, Q.Gòvấp, Tp.HCM

ĐT: (08) 9967 677 – 5894 930

KS Trúc: 0913.909 800 – KS Chương: 0918.763 851

MAI XUÂN – Đi lên cùng nhà nông! (tháng 3-2004)